

धान खेतीमा उत्पादन बृद्धि गर्ने तरिका

परम्परागत धान खेतीबाट उत्पादन बढाउन मुस्किल भइसकेको छ । धेरै श्रम लाग्छ र मलमा पनि धेरै खर्च हुन्छ । आधुनिक तरिकाबाट खेती गर्न बाहिरको स्रोतमा खर्च बढी नै हुन्छ । रासायनिक मल, किटनाशक औषधि र नयाँ बीउ प्रयोग गरेमा मात्र उत्पादन बढाउन सकिन्छ ।


साधारण किसानलाई यी सबै कुरामा खर्च गर्न मुस्किल छ । यी रासायनिक पदार्थ प्रयोग गर्दाखेरि वातावरणलाई हानि हुन्छ भन्ने पनि प्रमाणित भइसकेको छ । त्यसैले हामी यहाँ स्थानीय बीउ र प्राङ्गारिक पदार्थको प्रयोग गरेर धानको उत्पादन बढाउने प्रविधिका बारेमा चर्चा गर्दै छौं । यसलाई धान उत्पादन बृद्धि गर्ने तरिका अर्थात् अङ्ग्रेजीमा “*System of Rice Intensification*” (S.R.I.) भनिन्छ । त्यसलाई यहाँ हामी छोटकरीमा “एस.आर.आई” तरिका भन्दछौं ।




एस.आर.आई. तरिकाले पलाएको धानको गाँज । यो गाँज एउटा बीउबाट पलाएको हो !!!

एस.आर.आई. तरिकामा मुख्य चारवटा क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउँछ :-

१. धानको बीउ ब्याडमा छरेर टुसाएको आठदस दिनभित्र रोपाई गर्नपर्छ ।
२. बेर्ना सार्दा एकएकवटा मात्रै अलग-अलग सार्नुपर्छ ।
३. सार्दाखेरि बिरुवा टाढा-टाढा लगाउनुपर्छ । एक बित्तादेखि एक हातसम्म टाढा रहने गरी बिरुवा लगाउनुपर्छ ।
४. खेतमा बढी पानी हाल्नु हुँदैन ।



(१) धानको बीउ नर्सरीमा छरेर टुसाएको आठदस दिनभित्र बिरुवा सार्नुपर्छ । अथवा लेखाली भेगमा धानको बिरुवाको दुईवटा पात मात्र टुसाउन बढि दिन लाग्न पनि सक्छ तर जति दिन लागेपनि दुईवटा पात भएको अवस्थामा सार्नुपर्दछ । धानको बीउको बोक्राले बिरुवा नछाडिकनै बिरुवा सार्नुपर्छ । यी कलिला बिरुवालाई एकदमै ध्यान दिएर विस्तारै सार्नुपर्दछ । यसले गर्दा बिरुवाको जरा माथि (उकालोमुखि) पर्दैन तल (उरालोमुखि) मात्रै पर्दछ । हतारमा सान्यो भने बिरुवालाई दुःख हुन्छ र यसले गर्दा बिरुवाको पछि बढ्न र फल्ने क्षमता नै घट्छ । त्यसैले बिरुवालाई सानै छँदा सार्नुपर्छ । सानो अवस्थामा बेर्ना सार्दाखेरि बेर्नाको बढ्न र फलन सकिने क्षमता घट्दैन, त्यसको जरा ठूलो हुन्छ र धेरै अन्न फलाउँछ ।




Joshua Harber

दस दिनको बेर्ना

(२) एकएकवटा बिरुवा मात्रै सार्नुपर्छ । चलन चल्तीको तरिकामा ३, ४, ५, ६ वटासम्म बिरुवा सँगै रोप्ने चलन छ । यसले गर्दा बिरुवाबीचमा प्रतिस्पर्धा (होड बाजी) हुन्छ । अलग-अलग बिरुवा सार्दाखेरि यस्तो प्रतिस्पर्धा हुँदैन ।

अलग-अलग बिरुवाले बढी मल र पानी प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

(३) रोपाइँ गर्दा खेतमा बेर्ना टाढा-टाढा लगाउनुपर्छ । प्रत्येक बिरुवा बीचमा २० देखि ५० से.मी. अथवा



Christi Sobel

एक बित्तादेखि एक हातसम्म दूरी टाढा चाहिन्छ । बिरुवा धेरै नजिक भएमा प्रतिस्पर्धा हुन्छछ । घाम, हावा र पानीको लागि धानका बिरुवाबीचमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ । टाढा-टाढा रोप्दाखेरि बिरुवालाई चाहिने जति हावा खेल्न पाउँछ र बिरुवाको सूर्यको प्रकाश र खाद्य तत्त्व पाउन सक्छ । र टाढा-टाढा सार्दा बीउ थोरै भए पुग्छ । वर्तमान तरिकामा प्रति हेक्टरमा एक क्वीन्टल धानको बीउ लाग्छ भने (अथवा प्रति विघामा ७० किलो बीउ अथवा एक रोपनीमा सादेपाँच किलो बीउ लाग्छ भने) एस.आर.आई.को तरिकामा प्रति हेक्टरको ७ किलो बीउ मात्रै लाग्छ (अथवा प्रति विघाको साडेचार किलो बीउ अथवा प्रति रोपनीको आधा किलो बीउ) ।

(४) बिरुवा सारेपछि खेतमा बढी पानी हाल्नु हुँदैन । वर्तमान तरिकामा खेतमा पानी हाल्ने कारण मुख्य भ्रार नियन्त्रण वा रोकथामको लागि हो । तर यसले गर्दा माटोमा हावापानी कम पस्न पाउँछ । बढी पानी भएपछि ७५०० सम्म जरा मर्न सक्छ भन्ने कुरा वैज्ञानिक अनुसन्धानले देखाइसकेको छ । बिरुवाको फेदमै प्रसस्त पानी पाएपछि जरा धेरै बढ्दैन । एस.आर.आई. तरिकामा बेला-बेलामा माटो सुकाएमा बढी हावा पास हुन्छ र बिरुवाका जराहरू बढी फैलिन्छन् । यसले गर्दा ठाउँको राम्रो प्रयोग हुन्छ र बिरुवाले बढी खाद्यतत्त्व प्राप्त गर्न सक्छ ।

माथिका चारवटा कुरामा ध्यान दिएर निम्न लिखित तरिकाबाट एस.आर.आई.

Gamini Batuwitage




नर्सरीमा धानको बेर्ना पातलो लगाएर
बिस्तारै माटोसँग उखेल्न लागेको

तरिकाबाट धान खेती गरिन्छ ।

- पहिलो वर्तमान तरिका अनुसार जस्तै नर्सरीमा बीउ लगाउने तर त्यो तरिकाभन्दा अझै पातलो लगाउन राम्रो हुन्छ । पातलो गरी बीउ राख्नाले खेत रोप्दा अलगअलग बेर्ना उखेल्न सजिलो हुन्छ ।
- बीउ टुसाएको एक हप्तादेखि दश दिनसम्ममा बेर्ना सार्नुपर्छ वा जुन बेला दुईवटा पात मात्र टुसाएको हुन्छ त्यहिँ बेला मात्र सार्ने । त्यो बेलामा बिरुवामा बीउको बोक्रा अझै टाँसिएको हुन्छ ।

- बेर्ना उखेल्दा एकदमै ध्यान दिएर उखेल्नुपर्छ र घाममा नदेखाई रोप्नुपर्छ । बिरुवा उखेलेपछि सकेसम्म १५ मिनेटभित्र अथवा ढिलोमा आधा घण्टाभित्र नै खेतमा बिरुवा लगाइ सक्नु राम्रो हुन्छ ।
- बिरुवा लगाउँदाखेरि सबै जरा तल पार्नुपर्छ । माथि पार्नु हुँदैन ।

आठ-दश दिनको बेर्नालाई
नर्सरीबाट उखेलेको



Gamini Batuwitage



खेतमा ठिक दूरिमा बेर्ना रोपनको लागि काँटिले यसरी रेखा बनाउँछ । काँटिको ढाँतविचको दुरी जति टाढा छ त्यति टाढा बेर्ना लगाईन्छ ।

- रोप्दाखेरि अलग-अलग सिङ्गै-सिङ्गै बिरुवा मात्रै लागउनुपर्छ । बिरुवाबीचको दूरी २० देखि ५० सेमी टाढासम्म हुनुपर्छ । यो दूरी कति हुनुपर्छ भन्ने कुरा किसानहरू आफैँले पनि अनुसन्धान गर्न सक्छन् । कुनै ठाउँमा २० से.मी.को दूरी ठीक हुन्छ भने, कुनै ठाउँमा २५, ३०, ४०, वा ५० से.मी.सम्म लगाउन सकिन्छ ।

त्यसपछि रेखा अनुसार यसरी बेर्ना लगाउँछ । एस.आर.आईमा २० देखि ५० से.मि. बेर्ना लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।



- खेतमा बिरुवा सारिसकेपछि धेरै पानी लगाउनु हुँदैन । सुरुमा दुई हप्तासम्म चिस्यान बढी राख्नुपर्छ । त्यसपछि हप्ताको एक चोटीसम्म माटो पूरा फुट्ने गरी सुकाउन राम्रो हुन्छ । यसबेला आकाशबाट पानी पर्‍यो भने पुग्छ । यदि पानी परेको छैन भने साँझ मात्रै पानी हालेर

र बिहानसम्म बाँकी रहेको पानी सुकाउनुपर्छ । धान फुल्न थालेपछि दुई अमल बराबर पानी खेतमा राख्न राम्रो हुन्छ । धान काट्नुभन्दा २५ देखि ३० दिन अगाडि पूरा पानी सुकाउनुपर्छ ।




बेर्ना लगाउँदा त्यसको जरा तल पर्ने गरी लगाउनुपर्दछ ।

एस.आर.आई
तरिकाले रोपेको
धान एक माहिना
पछि यस्तो देखिन्छ



Gamini Batwitage



Gamini Batwitage

गोडमेल

पानी कम भएकोले र बिरुवा टाढा भएकाले गोडमेलमा बढी खर्च हुन्छ तर उत्पादन पनि बढी हुन्छ । खेतमा बिरुवा सारिसकेपछि १०-१२ दिन पछि पहिलो गोडमेल गर्नुपर्छ । यसलाई १४ दिनपछि फेरि गोडमेल गर्नु राम्रो हुन्छ । कम्तीमा ३-४ चोटी गोडमेल गर्नुपर्छ त्यसपछि जति बढी गोडमेल गर्नु त्यति आम्दानी बढ्छ । गोडमेल गर्दाखेरि आएको झारपात वा हरियो मल काटेर त्यही माटोमा राख्नु वा मिसाइदिनुपर्छ ।

एउटै बेर्नाबाट बनेका ठूलो धानको गाँज ।

मल

खेतमा राम्रो प्राङ्गारिक मल हालन आवश्यक छ किनभने यसबाट जराको राम्रो वृद्धि हुन्छ । बिरुवा टाढा-टाढा भएकोले बीचमा छापो हालन पनि मिल्छ । छापोले झारको पनि रोकथाम गर्छ । हरियो मलको प्रयोग पनि गर्न सकिन्छ । धान लगाउनुभन्दा पहिले धैँचाको हरियो मल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ ।



एस.आर.आई. तरिकाले
गरेको धानको बाला

बालीको बृद्धि

यसरी धान खेती गरेका ठाउँमा बिरुवा सानो र टाढा-टाढा हुने हुँदा एक महिनापछि धान एकदम नराम्रो जस्तो देखिन सक्छ । तर यसबेला जरामा मुख्य विकास भइरहेको हुन्छ । दोस्रो महिनामा धानले गाँज हाल्न सुरु गर्छ । तेस्रो महिनामा एकदम छिटो गाँजको बृद्धि हुन्छ । सबभन्दा धेरै खर्च रसमय रोपाइमा लाग्छ । त्यसपछि गोडमेल र पानी हाल्नेमा लाग्छ । रोपाइँमा समय खर्च धेरै हुन्छ किनभने एकदम ध्यान दिएर बेर्ना अलग-अलग सार्नुपर्छ तर अनुभव भएपछि यो काम छिटो हुन्छ । बीउ लगाउनुभन्दा पहिलो धैँचा हरियो मल पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ । खेत लगाइसकेपछि पनि माटो ढाक्न फेरि धैँचा हरियो मल वा कुनै छापो पनि हाल्न सकिन्छ किनभने यसले भारको रोकथाम गर्छ । उत्पादनको हिसाबमा साधारण किसानले २, ३, ४ गुणासम्म उत्पादन बृद्धि भएको देखिएको छ । कुनै किसानले ७÷८ गुणा बढी उत्पादन बृद्धि गरेको देखिएको छन् । यसको लागि सानो पातामा विचार गर्नुहोला र माथिका तरिका अनुसार ध्यान दिएर प्रयोग गर्नुहोस् र हामीलाई खबर गर्नुहोस् तपाइँको उत्पादन र खर्चको अनुभव कस्तो भयो भनेर ।



एस.आर.आई. तरिकाले गरेको खेत

धान खेती गर्दा वर्तमान तरिका र एस.आर.आई. तरिकाको तुलना

	वर्तमान तरिका	एस.आर.आई. तरिका
प्रति गाँजमा बेर्नाको सङ्ख्या -	४	१
प्रति गाँजमा हाँगाको सङ्ख्या -	८.६	५५
प्रति हाँगामा गेडाको सङ्ख्या -	११४	१८१
प्रति गाँजमा गेडाको सङ्ख्या -	८२४	५८५८
उत्पादन (प्रति हेक्टरमा टन्) -	२.०	७.६

Joelbarison 1998

यस विषयमा अनुसन्धान गर्न इच्छुक भएका संस्था अथवा किसान साथै थप जानकारीको लागि Appropriate Technology Asia सँग सम्पर्क राख्नुहोस् ।

Tel: 01-549034 email atanepal@mail.com.np